

盐酸氨溴索口服溶液说明书



请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：盐酸氨溴索口服溶液

商品名称：瑞田

英文名称：Ambroxol Hydrochloride Oral Solution

汉语拼音：Yansuan Anxiusuo Koufufurongye

【成份】 本品每10毫升含盐酸氨溴索30毫克，辅料为蔗糖、甜菊素、柠檬酸、柠檬酸钠、薄荷脑、乙醇、菠萝香精。

【性状】 本品为无色至微黄色的澄清液体。

【作用类别】 本品为祛痰药类非处方药药品。

【适应症】 用于急、慢性支气管炎引起的痰液粘稠、咳痰困难。

【规格】 10毫升：30毫克

【用法用量】 口服，成人及12岁以上的儿童：通常在治疗的最初2-3天，一次1支（10毫升），一日3次；然后减少为一次1支（10毫升），一日2次。12岁以下的儿童：6-12岁儿童：每次1/2支（5毫升），一日2-3次；2-5岁儿童：每次1/4支（2.5毫升），一日3次。

【不良反应】 极少数患者有轻度的胃肠道不适（如恶心、呕吐、消化不良、腹泻）及过敏反应（如皮疹，罕见血管神经性水肿），罕见头痛及眩晕等。

【禁忌】 尚不明确

【注意事项】

1. 孕妇、哺乳期妇女慎用。
2. 2岁以下儿童应在医师指导下使用。
3. 肝肾功能不全的患者，应在医师指导下使用。
4. 应避免与中枢性镇咳药（如右美沙芬等）同时使用，以免稀化的痰液堵塞气道。
5. 本品为一种粘液调节剂，仅对咯痰症状有一定作用，在使用时应注意咳嗽、咯痰的原因，如使用7日后未见好转，应及时就医。
6. 如服用过量或发生严重不良反应时应立即就医。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】本品与抗生素（阿莫西林、头孢呋新、红霉素、强力霉素）同时服用，可导致抗生素在肺组织浓度升高。本品与 β 2-受体激动剂、茶碱等扩张支气管药物有协同作用。如与其他药物同时使用可能发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品为粘液溶解剂，能增加呼吸道黏膜浆液腺的分泌，减少粘液腺分泌，从而降低痰液粘度，促进肺表面活性物质的分泌，增加支气管纤毛运动，使痰液易于咳出。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】玻璃管制口服液体瓶装，每盒6支，每盒10支。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2015年版二部

【批准文号】国药准字H20010534

【说明书修订日期】2015年11月09日

【生产企业】

企业名称：黑龙江中桂制药有限公司

生产地址：黑龙江省庆安县东城区

邮政编码：152400

电话号码：0455-4313333

传真号码：0455-4313355

网 址：www.zhongguizy.com

如有问题可与生产企业联系。